

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

ABONNEMENT ANNUEL :

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux

Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN SPECIAL LIMOUSIN-FRUIT 1981 - N° 15

Le 12 Août 1981

ARBORICULTURE FRUITIÈRE en Limousin

N° 208

bulletin
spécial

ARBRES FRUITIERS à PEPINS

Tavelure - Oïdium

Contre ces maladies qui peuvent encore évoluer avec les conditions pluvieuses que nous connaissons, bien maintenir la protection dans les vergers atteints.

Acarien rouge

La surveillance de ces ravageurs doit se maintenir notamment dans les situations sensibles afin de pouvoir intervenir rapidement sur les formes mobiles observées sur les feuilles.

En effet, il est important, à cette époque, de pouvoir lutter contre les acariens avant que les femelles adultes puissent déposer leurs oeufs d'hiver. De ces pontes hivernales, dépendra en effet la gravité des attaques au printemps prochain.

Il est donc important de choisir un acaricide efficace sur les formes mobiles et d'adapter le volume de liquide à employer au développement de la végétation.

Attention au respect des délais d'emploi avant la récolte pour des variétés très précoces. Certains acaricides doivent être utilisés au moins 30 jours avant celle-ci (amitraz, azocyclotin, cyhexatin).

Carpocapse pommier , _poirier , NOYER

Les captures au piège sexuel restent très faibles.

Les chenilles de première génération commencent seulement, de façon notable, leur migration pour la nymphose.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'effectuer un traitement actuellement.

Un prochain bulletin vous informera de la date d'intervention pour le deuxième vol.

DIRECTEUR-GÉRANT : J. THIAULT.

P.1.155

ARBRES FRUITIERS à NOYAUX

PRUNIER

(Pour les variétés très tardives uniquement)

Carpocapse

Une reprise d'activité de ce papillon a été enregistrée et les captures demeurent notables. Effectuer une nouvelle intervention si les délais d'emploi avant récolte des produits utilisés le permettent encore.

Moniliose

Cette maladie peut provoquer d'importants dégâts après la période pluvio-orageuse que nous venons de connaître.

Un traitement peut encore être envisagé sur les variétés dont la récolte n'interviendra pas avant le début du mois prochain.

Il est rappelé qu'un délai de 15 jours avant récolte doit être respecté pour l'utilisation de Rovral (iprodione) et Ronilan (vinchlozoline).

NOYER

bactériose

En raison des pluies importantes, renouveler le traitement contre cette maladie (utiliser un produit cuprique à 125 g de cuivre métal par hl).

P/Le Chef de la Circonscription
Phytosanitaire

L'Adjoint,

J.C. LUC

N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 525 AD